



**ХИВ превенцијата се
означува скратено со ABC**

A-abstinence-
одбегнување на несигурен
секс .

B-be faithful to your partner-
биди верен на својот
партнер

C-condom-
користи кондом.



III Македонска бригада 18

1000 Скопје


Р.Македонија

тел: +389 2 3298667

e-mail: info@cph.mk

www.cph.mk


J.3.O. Завод за здравствена заштита Скопје



Заедно да се бориме против СИДА-та !!!

SIDA-Синдром на стекната имунодефицијација.

Сидата е неизлечива болест настаната од ХИВ вирусот кој го напаѓа одбранбениот систем и со текот на времето го уништува.



Заразеното лице може да е заболено или носител на ХИВ вирусот.

- Носител на вирусот е лице заразено со Хив-вирус, без знаци на заболување.
- Лице болно од Сида има манифестији знаци на заболување.

SIDA-та прв пат е регистрирана во САД во 1983 година и од тогаш стана најраспространета епидемија во светот

Околу 40 милиони луѓе во светот живеат со HIV.

ИЗВОР-лица инфицирани со вирусот (болен или носител на ХИВ вирусот)

НА ЧИН НА ПРЕНЕСУВАЊЕ

биолошки течности:

КРВ-парентерален начин

СПЕРМА-сексуална транасмисија

ЦЕРВИКО-ВАГИНАЛЕН СЕКРЕТ-
мајчинско- фетална трансмисија

**СЕКСУАЛНО ПРЕНОСЛИВИ
БОЛЕСТИ**

ПЛУНКА- не е докажано

РИЗИК ФАКТОРИ

- Интравенска апликација на дрога - употреба на користени игли и шприцеви
- Трансфузија и трансплантација
- При медицински и стоматолошки интервенции без соодветна заштита
- Сексуален живот без употреба на кондоми - (хетеро, хомо ... вагинално, анално, орално)
- Мајка - дете трансмисија (за време на бременоста, при породување, преку мајчино млеко)
- ХИВ состојба на сексуалниот партнер

КАКО НЕ СЕ ПРЕНЕСУВА ХИВ/СИДА ?

- ракување,
- гушкање, галење
- кивање, кашлање
- бакнеж во образ
- солзи
- пот
- прибор за јадење
- вода, базени, тоалетни школки, сауна
- инсекти
- постелнина
- работа и живеење во исти простории

