



HIV preventiva
shkurtimisht shënohet me
A B C

A-abstinence-
aratisje e seksit të pasigurtë.

B-be faithful to your partner-
bëhu besnik i partnerit tënd.

C-condom-
shfrytëzo kondom.



III Makedonska Brigada - 18
1000 Shkup R.Maqedonisë
tel: +389 2 3298667
e-mail: info@cph.mk
www.cph.mk


O.Th.Sh. Enti për mbrojtje shëndetësore Shkup



Bashkarisht të luftojmë kundër Sidës !!!

SIDA- Sindrom i imunodeficiencës së fituar.

Sida është sëmundje e pashërueshme e shkaktuar nga virusi HIV i cili sulmon sistemin e mbrojtjes dhe me kohë e shkatëron atë.



Personi i infektuar mund të jetë i sëmurë ose bartës i virusit HIV.

- Personi i infektuar është i sëmurë ose bartës i virusit HIV, nuk manifeston shenjat e sëmundjes.
- Personi i sëmurë nga SIDA manifeston shenjat e sëmundjes.

SIDA Për her të parë është regjistruar në SHBA në vitin 1983. Në ditët tona është epidemia më e përhapur në botë. Në botë ka rreth 40 milion njerëz që jetojnë me virusin e HIV-it.

BURIMI - personat që janë të infektuar prej virusit (i sëmuri apo mbartësi i HIV virusit).

MËNYRA E BARTJES Lëngjet biologjike

- **GJAKU** - mënyra parenterale
- **SPERMA** - transmissiioni seksual
- **SEKRETI CERVIKO - VAGINAL** transmissiioni fetal - amnor
- **SËMUNDJET SEKSUALE MBARTËSE**
- **PËSHTYMA** - nuk është vërtetuar

FAKTORËT E RREZIKSHËM

- Marrja intravenoze e drogës - Përdorimi i gjilpërave dhe shiringave të shfrytëzuara
- Transfuzioni dhe transplantimi
- Mos mbrojtja përkatëse gjatë intervenimeve mjekësore dhe stomatologjike
- Marrëdhëniet seksuale pa përdorim të kondomeve - (hetero, homo - vagjinale, anale, orale)
- Nëna - fëmija transmissiion (gjatë shtatëzaniisë, gjatë lindjes, përmes qumështit të nënës)
- Partneri seksual me HIV virus

SI NUK BARTET HIV/SIDA ?

- Përrshëndetje me dorë
- Përrqafim, ledhatim
- Teshtitje, kollitje
- Puthje në faqe
- Lotë
- Djersa
- Servisi i ngrënies
- Uji, bazeni, nevojtoire, sauna
- Insektet
- Shtrojet e shtratit
- Puna dhe jeta në vende të përrbashkëta

