



ТУТУНОТ, ЗАБОЛЕНОСТА И СМРТНОСТА

Нов извештај во списанието *The Lancet*, кој користи податоци од Истражувањето за глобалната оптовареност со болести, додава квантитативни детали на веќе опширната меѓународна литература за влијанието на глобалната епидемија на тутунот врз здравјето. Извештајот обезбедува детална проценка за смртноста и инвалидитетот предизвикани од пушењето на ниво на држава.

Наодите се воздржани. Во 2015-та пушењето предизвикало повеќе од еден случај од вкупно десет случаи на смрт во светот, убивајќи над 6 милиони луѓе, со глобална загуба од близу 150 милиони години на живот прилагодени на инвалидитет. Преваленцата на пушењето и консекутивниот морбидитет и морталитет денес опаѓаат во повеќето, иако не во сите, богати земји. Смртноста во иднина во земјите со низок и среден доход се очекува да биде голема.

Во светот се проценува дека едно од четири лица, или вкупно 933 милиони луѓе, се секојдневни пушачи. 80% од овие пушачи живеат во земјите со низок и среден доход. Половина од секојдневните пушачи, или половина милијарда луѓе кои се живи денес, може да се очекува предвремено да умрат од пушење, освен ако не престанат да пушат.

Денес, раширеноста на пушењето е сеуште ниска во земјите со низок социо-демографски индекс, но, врз основа на претходни искуства од побогатите земји, зависи само кога прво мажите, а потоа и жените во сите земји ќе се откажат од пушењето и за одредено време ќе умрат од рак на белите дробови, од хронична опструктивна белодробна болест или од други болести предизвикани од пушењето, како што веќе се случило во побогатите земји. Иако преваленцата на пушењето опаѓа во многу земји со низок и среден доход, вклучувајќи многу од земјите со најголем број пушачи (на пр. Кина и Индија), порастот на населението упатува на тоа дека бројот на пушачи, а поради тоа и оптовареноста со штетата од пушењето, продолжува да расте.