


## Карцином на грло на матка - Carcinoma cervicis uteri



**Карциномот на грлото на матката е најчестиот малигнен тумор на гениталниот тракт.** Најчесто се јавува кај жените меѓу 35 и 50 години старост, иако не е редок и кај помладите, односно постарите жени. Најчест е кај жената во полна животна сила, кога тие се најпродуктивни за општеството и семејството. **Human papillomavirus – от е најчесто обвинуван за појавата, причината на карциномот на грлото на матката.**

Од рак на грлото на матката почесто заболуваат жените кои рано почнале со сексуални односи, рано се мажат, жени со повеќе бракови, жени кои боледуваат од сексуално преносливи болести, жени кои имале сексуален однос со партнери кои немаат извршено циркумсиција, жени кои често менуваат партнери (промискуитет), проститутки, жени кои слабо, лошо или никако не ја одржуваат личната хигиена.

### **Симптоми кои треба да ја предупредат жената дека нешто не е во ред:**

- ⇒ Почетен симптом е наголемен, нечист исцедок, кој е речиси секогаш измешан со крв.
- ⇒ Контактни крварења (крварење по сексуалниот однос, при напнување поради тврда столица, по испирање на вагината).
- ⇒ Болката секогаш е задоцнет симптом и локализацијата е во долниот дел на абдоменот и во крстот (таа настапува дури во вториот стадиум на болеста, кога карциномот се проширил).

### **Рана дијагноза на карцином на грло на матка.**

Жената, покрај сите биолошки оптоварувања со кои природата ја “надарила” и обврзала (менструации, бременост, раѓање, доење), сепак анатомијата и топографијата на нејзините генитални органи (едноставниот, безболан пристап до грлото на матката), ја чини “повластена” во можноста за раното откривање на ракот на грлото на матката, а што не е случај со другите локализации на ракот на гениталните органи и воопшто во организмот. **ЗАТОА, ТАА ПРЕДНОСТ ЖЕНАТА ТРЕБА СЕКОГАШ ДА ЈА КОРИСТИ, НАЈРАЦИОНАЛНО,** со што може да се спасат **МНОГУ, МНОГУ** женски животи и да им се продолжи животниот век, **САМО СО ЕДЕН ОБИЧЕН ПРЕГЛЕД И ЗЕМАЊЕ НА БРИС.** Со добра организација на здравствената служба и здравствено образование на жените може да се постигне многу во борбата против тој карцином. Доколку жената доаѓа на гинеколошки преглед редовно, двапати годишно, карциномот може да се открие во најраната т.н. претклиничка фаза, кога излекувањето е стопроцентно.

*Извор: Стручно-медицинска литература, “Гинекологија и акушерство” – Д-р Глигор Палчевски, Скопје, април 1997 година, Просветно дело.*